

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



К.А. САВЕНКОВ
18.09.2026

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению вакцины
«ВНИИЗЖ- ящур универсальная»

(Организация-разработчик: ФГБУ «ВНИИЗЖ», 600901, Владимирская обл.,
г. о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6)

Номер регистрационного удостоверения: № 12-1-33.12-1147 №ПВР-1-1.9/00219

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата:
«ВНИИЗЖ- ящур универсальная».

Международное непатентованное наименование: Вакцина против ящура универсальная сорбированная моно- и поливалентная (из вируса, выращенного в клетках ВНК-21).

2. Лекарственная форма – суспензия для инъекций.

Вакцина произведена из инаktivированных аминоэтилэтиленимином производственных штаммов вируса ящура одного или нескольких типов А, О, С, Азия-1, САТ-1, САТ-2 и САТ-3, полученного в суспензии клеток ВНК-21, сорбированного на гидроокси алюминия (60-80 %) с добавлением сапонины (1,5 мг).

3. По внешнему виду вакцина представляет собой жидкость розового или светло-желтого цвета с рыхлым белым или светло-серым осадком, образующимся при хранении и легко разбивающимся в равномерную взвесь при взбалтывании.

Срок годности вакцины 24 месяца от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Вакцину следует использовать в течение 10 часов после вскрытия флакона. Запрещается применять вакцину с истекшим сроком годности.

4. Вакцину расфасовывают в следующих объемах:

Объем вакцины (см ³)	Количество доз для крупного рогатого скота, верблюдов, яков, оленей, свиней	Количество доз для овец и коз
50	25	50
100	50	100
200	100	200
500	250	500
1000	500	1000
2000	1000	2000
5000	2500	5000

Вакцина расфасована в стеклянные или пластиковые флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Вакцину в качестве «балк-продукта» расфасовывают в металлические или полимерные емкости в следующих объемах:

Объем вакцины (см ³)	Количество доз для крупного рогатого скота, буйволов, верблюдов, яков, оленей, свиней	Количество доз для овец и коз
10 000	5 000	10000
20 000	10 000	20 000
25 000	12 500	25 000
50 000	25 000	50 000

Допускается и другая фасовка, согласованная в установленном порядке.

Флаконы с вакциной упакованы в ящики из гофрированного картона или коробки пенополистирольные с наличием гнезд или перегородок, обеспечивающих целостность флаконов. В каждый ящик с вакциной вложены три инструкции по применению.

5. Вакцину транспортируют и хранят в упаковке организации-производителя и у потребителя в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С. Замораживание вакцины не допускается.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или

консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, подвергшиеся замораживанию, а также с вакциной неиспользованной в течение 10 часов после вскрытия флакона, подлежат выбраковке и обеззараживанию кипячением в течение 30 минут или обработке 2%-ным раствором щелочи, или 5%-ным раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцину отпускают без рецепта.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Вакцина относится к фармакотерапевтической группе иммунобиологических лекарственных препаратов.

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к вирусу ящура на 4 сутки после однократного применения, который сохраняется в течение 12 месяцев.

В рекомендованных дозах вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. Порядок применения

11. Вакцина предназначена для вынужденной и профилактической иммунизации всех восприимчивых к ящуру сельскохозяйственных животных, вызываемого вирусом типа А, О, С, Азия-1, САТ-1, САТ-2 и САТ-3.

12. Противопоказаний к применению вакцины нет.

13. При проведении вакцинации необходимо соблюдать общие правила асептики, личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в соответствующую спецодежду, с обязательным использованием средств индивидуальной защиты: халат или комбинезон, головной убор, маска медицинская, резиновые перчатки. В местах работы должна находиться аптечка для оказания первой доврачебной помощи.

При попадании вакцины на кожу или слизистые оболочки их необходимо промыть большим количеством проточной воды.

При случайной инъекции вакцины человеку место введения обработать 70%-ным раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

14. Применение вакцины в установленной дозировке является безвредным для стельных животных, для животных в период лактации и для молодняка. При вакцинации нетелей и/или коров в последней стадии стельности должны соблюдаться необходимые меры предосторожности, во избежание травмирования стельного животного и/или плода.

15. При возникновении ящура или непосредственной угрозе, для создания иммунитета в ранние сроки, восприимчивых животных иммунизируют однократно удвоенной дозой. Молодняк, родившийся от ранее привитых матерей, рекомендуется прививать с 2-месячного возраста, а в зонах, где противоящурную вакцинацию не проводили, - с однодневного возраста.

При профилактической вакцинации, проводящейся в зонах систематического применения вакцины, животных всех возрастов прививают однократно, один раз в год: крупный рогатый скот с 4-месячного возраста, свиней, овец и коз с 2-месячного возраста.

Перед применением флакон с вакциной тщательно встряхивают до образования гомогенной взвеси.

Животным вводят вакцину в дозах, указанных на этикетке флакона:

- крупному рогатому скоту, буйволам, якам, верблюдам и оленям – подкожно в область средней трети шеи или подгрудка, в дозе - 2 см³;
- овцам и козам – подкожно с внутренней стороны бедра, в дозе – 1 см³;
- свиньям – внутримышечно за ушами, в дозе – 2 см³.

Шприцы и иглы стерилизуют кипячением, место введения вакцины дезинфицируют 70%-ным раствором этилового спирта. Для каждого животного используют отдельную иглу или шприцы инъекционные для однократного применения.

16. У отдельных животных после иммунизации в течение 1-3 суток может регистрироваться незначительное повышение температуры тела и снижение аппетита, а на месте введения вакцины образуется припухлость, что не требует специальных методов лечения.

17. Симптомов при передозировке вакцины не установлено.

18. Применение вакцины не исключает использование других лекарственных препаратов. Не разрешается смешивать вакцину с другими лекарственными препаратами в одном шприце.

19. В случае возникновения аллергической реакции, животным вводят антигистаминные препараты.

20. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики против ящура. В

случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

21. Мясо, молоко и другую продукцию, полученную от здоровых вакцинированных животных, используют без ограничений.

Наименование, адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Владимирская обл., г. о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6, корпус 11.

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Владимирская обл., г. о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6.

Руководитель испытательной лаборатории
ветпрепаратов ФГБУ «ВНИИЗЖ»



Е.А. Яснева