

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

А.А. САВЕНКОВ

10 6 MAR 2026

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению вакцины

«ВНИИЗЖ-Аденовак»

(Организация-разработчик: ФГБУ «ВНИИЗЖ», 600901, Владимирская область,
г. о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6)

Номер регистрационного удостоверения: 12-1-4.26-5444N/ВР-14.26/04169

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: «ВНИИЗЖ-Аденовак».

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата:
вакцина против аденовирусных инфекций птиц инактивированная сорбированная.

2. Лекарственная форма – суспензия для инъекций. Вакцина произведена из
тканевой суспензии печени от цыплят, инфицированных вирусом гидроперикардита
кур (штамм «КР-95»), и тканевой суспензии тушек эмбрионов категории SPF,
инфицированных аденовирусом птиц вида Е (штамм «ВНИИЗЖ/FAdV-E»),
инактивированных димером аминокэтилэтиленимина с добавлением сапонины и
гидроокиси алюминия (50% по объему).

3. По внешнему виду вакцина представляет собой жидкость светло-
коричневого цвета с осадком сорбента, образующимся при хранении на дне
флакона, легко разбивающимся при взбалтывании в гомогенную взвесь.

Срок годности вакцины 12 месяцев от даты выпуска, при соблюдении условий
хранения и транспортирования. Вакцину необходимо использовать в течение 2
часов после вскрытия флакона. По истечении срока годности вакцина к применению
не пригодна.

4. Вакцина расфасована по 200 см³ (400 доз) или 500 см³ (1000 доз) в
пластиковые флаконы соответствующей вместимости, герметично закупоренные
резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Флаконы с вакциной, расфасованной по 200 см³ (400 доз), упакованы
по 1-25 штук или расфасованной по 500 см³ (1000 доз) упакованы по 1-16 штук в

коробки пенополистирольные или ящики из гофрокартона. Коробки пенополистирольные или ящики из гофрокартона с наличием гнезд или перегородок, обеспечивают неподвижность и целостность флаконов. Каждую коробку с вакциной снабжают инструкцией по применению.

5. Вакцину хранят и транспортируют в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С. Замораживание вакцины не допускается.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонней примеси, с расслоившейся эмульсией, не восстанавливающей однородность при взбалтывании, подвергшиеся замораживанию, а также остатки вакцины, не использованные в течение 2 часов после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут или обработке 2%-ным раствором щелочи или 5%-ным раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут, а также автоклавированием при температуре 130 °С в течение 30 минут с последующей утилизацией.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцину отпускают без рецепта.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Вакцина относится к фармакотерапевтической группе иммунобиологических лекарственных препаратов.

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у цыплят к вирусу синдрома гидроперикардита кур (СГПК) и аденовирусу птиц вида Е через 28 суток после однократного применения, продолжительностью не менее 9 месяцев.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. Порядок применения

11. Вакцина предназначена для профилактики инфекций, вызываемых вирусом синдрома гидроперикардита кур и аденовируса птиц вида Е в племенных и товарных птицеводческих хозяйствах различного направления выращивания.

12. Запрещается прививать клинически больную и ослабленную птицу.

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

К участию в проведении вакцинации не допускаются лица с признаками респираторных, желудочно-кишечных, кожных и аллергических заболеваний.

При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды. При случайном введении препарата человеку, место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

14. Запрещается применение вакцины в период яйцекладки.

15. Вакцинации подлежит птица в возрасте 5-20 суток. В особых случаях допускается вакцинировать цыплят суточного возраста в инкубатории. Ревакцинируют птиц в возрасте 100-140 суток, за месяц до начала яйцекладки.

Перед применением вакцину выдерживают в течение часа при температуре 20-25 °С. Запрещается подогревание вакцины на водяной бане и приборах отопления. Перед применением флакон с вакциной тщательно встряхивают для восстановления однородности суспензии.

Вакцину вводят однократно, подкожно в область средней трети шеи или внутримышечно в область грудной мышцы в прививной дозе 0,5 см³.

Для вакцинации используют шприцы-автоматы, которые стерилизуют кипячением в течение 20 минут. Допускается использование одноразовых шприцов. Место инъекции дезинфицируют 70%-ным раствором этилового спирта или другими антисептиками.

Через 28 суток после вакцинации проводят контроль напряженности иммунитета, исследуя не менее 25 проб сывороток крови в ИФА. Вакцинацию считают успешной, если не менее чем у 80% привитых птиц средний титр антител к возбудителю СГПК в ИФА в 2 и более раза превышает минимальное положительное значение, а к аденовирусу птиц вида Е средний титр антител составляет не менее одного положительного значения, предусмотренные инструкциями по применению используемых диагностических наборов.

При напряженности иммунитета менее 80%, птиц подвергают ревакцинации в независимости от времени последней вакцинации.

16. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией, побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

17. Симптомов проявления инфекций, вызываемых вирусом синдрома гидроперикардита кур и аденовирусом птиц вида Е, и/или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

18. Запрещается применение вакцины совместно с другими иммунобиологическими и лекарственными препаратами (антибиотиками, сульфаниламидами и пр.). Запрещается прививать птицу другими вакцинами в течение 5 суток после иммунизации.

19. Вакцина не вызывает клинически выраженной поствакцинальной реакции. В некоторых случаях на месте инъекции возможно образование небольшой припухлости, самопроизвольно исчезающей через 2-3 недели.

20. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики заболеваний, вызываемых вирусом синдрома гидроперикардита кур и аденовирусом птиц вида Е.

21. Убой птицы на мясо разрешается через 20 суток после введения вакцины. При убое птиц ранее этого срока тушки подлежат тщательному осмотру, и при обнаружении на месте введения вакцины признаков воспаления или не рассосавшейся суспензии, тушки выбраковывают и утилизируют. Инкубационное и столовое яйцо, полученное от вакцинированных птиц, используют без ограничения.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Владимирская область, г. о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6, к. 2.

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Владимирская область, г. о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6.

Заместитель руководителя
службы качества ФГБУ «ВНИИЗЖ»



А.В. Константинов