



ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению вакцины
«ВНИИЗЖ-ИАЦ»

(Организация-разработчик: ФГБУ «ВНИИЗЖ», 600901, Владимирская обл.,
г. о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6)

Регистрационное удостоверение 12-1-20.26-5563N[®]ПВР-1-20.26/04211

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: «ВНИИЗЖ-ИАЦ».

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата:
Вакцина против инфекционной анемии цыплят из штамма «LPDA23» живая сухая.

2. Лекарственная форма вакцины – лиофилизат для приготовления суспензии для перорального применения (живая вакцина). Вакцина произведена из гомогената тушек СПФ-эмбрионов кур, инфицированных штаммом «LPDA23» вируса инфекционной анемии цыплят с добавлением стабилизирующих компонентов (% по сухому веществу): гидролизата лактальбумина (5%), сахарозы (5%) и желатина (0,5%).

3. По внешнему виду вакцина представляет собой сухую однородную пористую массу светло-коричневого цвета, легко растворимую в воде в течение 2 минут.

Срок годности вакцины 18 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. После вскрытия флаконов вакцину необходимо использовать в течение 4 часов при температуре 15-25°C. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцина расфасована по 500 (4,0 см³) прививных доз в стеклянные флаконы соответствующей вместимости. Флаконы вакуумированы, герметично укупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Флаконы с вакциной упакованы по 1-20 штук в пенополистирольные коробки или пачки из картона с наличием гнезд, обеспечивающих их неподвижность и

целостность. В каждую коробку/пачку вкладывают инструкцию по применению вакцины.

5. Вакцину хранят и транспортируют в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С.

6. Вакцину следует хранить в местах недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной без этикеток, с нарушением целостности или герметичности укупорки, с измененным цветом или консистенцией содержимого, с наличием посторонней примеси, с истекшим сроком годности, а также остатки вакцины (в случае неиспользования ее в течение 4 часов после разведения) подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 60 минут или обработке 2% раствором щелочи, или 5% раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут.

Уничтожение обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцину отпускают без рецепта.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Вакцина относится к фармакологической группе иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у цыплят к возбудителю инфекционной анемии цыплят (ИАЦ) через 21-28 суток после однократного применения, который сохраняется не менее 9 месяцев.

Одна иммунизирующая доза вакцины содержит не менее 4,0 lg КИД₅₀ штамма «LPDA23» вируса ИАЦ.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. Порядок применения

11. Вакцина предназначена для профилактики ИАЦ в племенных и товарных птицеводческих хозяйствах всех направлений выращивания.

12. Запрещается прививать клинически больную или ослабленную птицу, а также птиц позднее, чем за 6 недель до начала яйцекладки.

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду (комбинезоны или халаты, сапоги, колпаки или косынки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты (очками закрытого типа, респираторами или медицинскими масками). В местах проведения работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

При случайном попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды. После работы с вакциной следует тщательно вымыть руки с мылом. В случае разлива вакцины, зараженный участок пола или почвы заливают 5% раствором хлорамина или 2% раствором едкого натрия.

14. Вакцина не предназначена для применения птице в период яйцекладки.

15. Иммунизации подлежат цыплята с 6-недельного возраста.

Вакцину применяют однократно перорально (методом выпаивания) с питьевой водой.

За сутки до начала вакцинации определяют количество воды, выпиваемое одной птицей за 1,5 часа, и рассчитывают её объем на все прививаемое поголовье.

Системы водообеспечения, имеющиеся в хозяйствах (поилки, ниппели, микрошашки) тщательно промывают без применения дезинфицирующих средств.

Перед началом вакцинации птицу яичных пород выдерживают без воды в течение 4-8 часов. Подача воды разрешается через 1,5 часа после проведения иммунизации. В жаркий период времени ограничение доступа к воде может быть сокращено.

Количество средств водообеспечения должно способствовать свободному доступу к препарату всего иммунизируемого поголовья. Фронт поения определяется возрастом птицы и технологией выращивания.

Необходимо использовать свежую, чистую, питьевую воду, охлажденную до комнатной температуры 20-22 °С. Для стабилизации вакцинного вируса в воду добавляют обезжиренное молоко из расчета 5 г сухого молока на 1 л воды.

Вакцину растворяют в воде из расчета 1 прививная доза на количество воды, выпиваемое одним цыпленком за 1,5 часа. Флакон с вакциной, заполняют водой, встряхивают до полного растворения препарата, и выливают в ёмкость, содержащую основной объём воды, необходимый для проведения вакцинации и распределяют по поилкам. Приготовленный таким образом препарат должен быть потреблен птицей в течение 1,5 часов.

Подача чистой питьевой воды и корма разрешается после полного потребления вакцины (после 1,5 часов).

16. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не отмечается.

17. Симптомов проявления инфекционной анемии цыплят или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

18. Запрещается применение вакцины «ВНИИЗЖ-ИАЦ» совместно с другими иммунобиологическими и лечебными препаратами. Применение препаратов специфической профилактики против других инфекционных болезней птиц проводят с интервалом не менее 5 суток до и после иммунизации ИАЦ.

19. Симптомов проявления инфекционной анемии цыплят при первичной иммунизации не установлено.

20. Следует избегать нарушений сроков проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики инфекционной анемии цыплят. В случае пропуска вакцинации необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

21. Продукты уоя и яйца от привитых птиц используют без ограничений. Инкубационное яйцо можно использовать не ранее, чем через 6 недель после вакцинации птицы.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Владимирская обл., г. о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6, корпус 11.

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Владимирская обл., г. о. город Владимир, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, д. 6.

И. о. заместителя руководителя
службы качества ФГБУ «ВНИИЗЖ»



А.В. Константинов