

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



К.А. САВЕНКОВ

26.10.2020

### ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению вакцины против ньюкаслской болезни  
инактивированной эмульсионной для голубей «ГОЛУБЬ-НБ»

(Организация-разработчик: ФГБУ «ВНИИЗЖ», 600901,  
Владимирская область, город Владимир, микрорайон Юрьевец)  
Регистрационное удостоверение: 12-1-2.20-4611№ПВР-1-13.15/03126

#### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: «ГОЛУБЬ-НБ».

Международное непатентованное или группировочное, или химическое наименование лекарственного препарата: Вакцина против ньюкаслской болезни инактивированная эмульсионная для голубей.

2. Лекарственная форма – эмульсия для инъекций. Вакцина изготовлена из экстраэмбриональной жидкости эмбрионов кур, инфицированных вирусом ньюкаслской болезни (штамм «Ла-Сота»), инактивированной аминоэтилэтиленимином (АЭЭИ) с добавлением масляного адъюванта в соотношении 30:70.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой однородную эмульсию белого цвета. При хранении допускается незначительное расслоение эмульсии, однородность которой восстанавливается при интенсивном взбалтывании.

Срок годности вакцины 24 месяца от даты выпуска, при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна. После вскрытия флакона, вакцину использовать в течении 2 часов.

4. Вакцина расфасована по 5 или 25 см<sup>3</sup> (20 или 100 прививных доз) в стерильные стеклянные или пластиковые флаконы соответствующей

вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Флаконы с вакциной упакованы в картонные или пенополистирольные коробки с наличием гнезд и перегородок, обеспечивающих их неподвижность и целостность. В каждую коробку вкладывают инструкцию по применению вакцины.

5. Вакцину хранят и транспортируют в темном месте при температуре от 2°C до 8°C. Замораживание препарата не допускается.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонней примеси, с расслоившейся эмульсией, не восстанавливающей однородность при взбалтывании, подвергшиеся замораживанию, а также остатки вакцины, не использованные в течение 2 часов после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и обеззараживанию путём кипячения в течение 30 минут или автоклавированием (0,11±0,02) МПа в течение 20 минут.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцину отпускают без рецепта.

## II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Вакцина относится к фармакологической группе иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

10. Вакцина «ГОЛУБЬ-НБ» вызывает формирование иммунного ответа у голубей к возбудителю ньюкаслской болезни через 21 сутки после однократного применения, продолжительностью не менее 6 месяцев.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

## III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактики НБ у голубей в благополучных, угрожаемых и неблагополучных хозяйствах.

12. Запрещается прививать клинически больную и/или ослабленную птицу.

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

К участию в проведении вакцинации не допускаются лица с признаками респираторных, желудочно-кишечных, кожных и аллергических заболеваний.

При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды. При случайном введении препарата человеку, место введения необходимо обработать 70%-ным раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

14. Вакцина не рекомендуется для введения молодняку птиц до 35-суточного возраста, а взрослым голубям – позднее чем за 3 недели до спаривания.

15. Вакцинируют голубей с 35-суточного возраста, с последующей ревакцинацией через 6 месяцев. Породистых выставочных голубей вакцинируют за 25-30 суток до выставки, а всех голубей вновь поступивших в хозяйство в период карантина. Взрослых голубей подвергают вакцинации ежегодно, не позднее, чем за 3 недели до спаривания. Перед применением вакцину выдерживают в течение часа при температуре 20-25°C. Запрещается подогревание вакцины на водяной бане и приборах отопления. Перед применением флакон с вакциной тщательно встряхивают для восстановления однородности эмульсии.

Вакцину вводят в объеме 0,25 см<sup>3</sup> внутримышечно в область грудной мышцы с соблюдением правил асептики.

Для вакцинации используют стерильные одноразовые шприцы с тонкими иглами. Место инъекции дезинфицируют 70%-ным раствором этилового спирта или другим дезинфицирующим раствором.

Через 21 сутки после вакцинации проводят контроль напряженности иммунитета, исследуя не менее 25 проб сывороток крови в РТГА. Вакцинацию считают успешной, если не менее чем у 80 % привитых птиц средний титр антител к вирусу НБ будет не ниже 1:32 в РТГА.

При напряженности иммунитета менее 80%, птиц подвергают ревакцинации в независимости от времени последней вакцинации.

16. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией, побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

17. Симптомов проявления ньюкаслской болезни или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

18. Запрещается применение вакцины с другими иммунобиологическими препаратами. Химиотерапевтические средства запрещается применять за 3-5 суток до вакцинации и через 5-7 суток после ее проведения.

19. Вакцина не вызывает клинически выраженной поствакцинальной реакции. В некоторых случаях на месте инъекции возможно образование небольшой припухлости, самопроизвольно исчезающей в течение 1 недели.

20. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики ньюкаслской болезни.

21. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины против ньюкаслской болезни инактивированной эмульсионной для голубей «ГОЛУБЬ-НБ» не устанавливаются.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Владимирская область, город Владимир, микрорайон Юрьевец.

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 600901, Владимирская область, город Владимир, микрорайон Юрьевец.

Заместитель директора ФГБУ «ВНИИЗЖ»



С.К. Старов